

① ティッシュ・ チラシ

安全

口から出す・
吐かせる

のどに詰まらなければ、
ほとんど問題はありません。
インクも、そのまま
大量に飲んだら別ですが、
印刷物を食べた程度なら
大丈夫。



⑤ ビニール

危険

口から出す・
吐かせる

胃に入れば問題ありま
せんが、のどに詰まらせ
ると危険。口の中に残っ
ているようならすぐに取り
出し、飲み込んだ場合は
便に出るまで様子を見
て。



⑨ 乾燥剤

ほとんど
危険なし

様子を見る

透明なつぶつぶのシリ
カゲルは、便に出るので
心配ありません。生石灰
などの粉になっているも
のは、胃や腸でやけどを
起こす心配があるため、
牛乳や卵白を飲ませ、吐
かせないで病院へ。



⑬ 画びょう・ ピン

危険

何もせず、
至急病院へ

とがったものは内臓に
穴をあけてしまうことも
あるので、必ず取る必要
があります。飲み込んだも
のと同じものを持参して、
至急病院へ。



台所用洗剤(中性) 様子を見る

ほとんど
危険なし

食器を洗うような一般的な中性洗剤は心配なし。薄めて使う
濃縮タイプを飲んだ場合は、一応注意して様子を見て。

住居用洗剤(中性) 様子を見る

ほとんど
危険なし

トイレ用・お風呂用など住居用洗剤でも中性洗剤ならほとん
ど心配なし。ただ、濃縮タイプは注意が必要。一応様子を見て。

住居用洗剤(酸・アルカリ)

危険

母乳・ミルク・牛乳を飲ませ、
吐かせずに病院へ

皮膚や粘膜を傷つけてしまうので、吐かせるのは危険です。
胃の粘膜を保護するためにミルクなどを飲ませて至急受診。

漂白剤

危険

水を飲ませ、
吐かせずに病院へ

なめた程度なら様子を見ますが、飲み込んだときは吐かせずに病
院へ。吐かせることと食道やのどを再び傷つけてしまいます。

洗剤・柔軟剤 様子を見る

ほとんど
危険なし

一般的な家庭用は、ほとんど問題ありません。濃縮タイプは
要注意。様子がおかしいと思ったら水などを飲ませて病院へ。

液体蚊取り・蚊取りマット 様子を見る

ほとんど
危険なし

蚊取りマットや液体タイプは、食べたり飲んだりしてもほと
んど心配ありません。ただ、ヒーター部分によるやけどに注意。

防虫剤

危険

水を飲ませて、至急病院へ

危険なものそうでないものがありますが、和服用のカンフ
ル(しょうろう)は特に危険です。いずれにしても飲み込んだもの
を持参して受診。母乳・ミルクや牛乳は飲ませません。

ボタン型電池

危険

至急病院へ

排泄されることが多いのですが、胃や腸にとどまると、化学
熱傷や組織腐食を起こして危険なことも。病院で取ってもらっ
たほうが安心。

石けん・シャンプー・リンス 様子を見る

ほとんど
危険なし

ほとんど危険はないので、水などを飲ませて様子を見て。変
わった様子がある場合は急のため受診します。

マニキュア除光液

危険

何も飲ませず、吐かせず、至急病院へ

有機溶剤(アセトンなど)が含まれていることがあるので、
石油と同様、吐かせたときに肺などに入ると肺炎を起こすこと
があり、危険。何もせず至急病院へ。胃の洗浄をする必要が。

② タバコ

危険

水を飲ませ、
吐かせる

食べたのが2cm程度なら、
そのまま様子を見て。4時間
しても症状が出なければ大丈
夫。ただ、2cm以上だっ
たり、吸い殻を入れた水・
飲みかけの缶ジュースや缶
コーヒーなどを飲んだ場
合はすぐ病院へ。



⑥ 土・砂・小石

安全

口から出す・
吐かせる

少量口に入れたくらい
なら問題ありません。口
の中に残っているようなら
取り除き、のどに詰ま
っていたら吐かせる。
飲み込んだ場合は、2〜
3日間便をよく観察して。



⑩ クレヨン

安全

様子を見る

専門家が使う画材は別
ですが、子どもが使うよ
うなクレヨンや水彩絵の
具には、危険な成分は含
まれていません。



⑭ 化粧品

ほとんど
危険なし

様子を見る

化粧水・乳液などはほ
んど問題ありません。
ただし、エタノールが含
まれているものを大量に
飲むと、アルコール中毒
を起こす可能性があります。
おかしいと思ったら受診して。



③ 小さいおもちゃ・ おもちゃの一部

ほとんど
危険なし

口から出す・吐かせる

とがったものでなければ心配
なし。のどに詰まっていたら、
吐かせる。胃に落ちた場合
はほとんど便とともに出て
きますが、食道内にとど
まっている場合もあるので、
念のために病院で処
置を決めてもらいます。



⑦ ピーナッツ などの食品

危険

様子に変化があ
ったら至急病院へ

気管に入ると、日数が
たってから呼吸障害を起
こすことも。せきこんだ
り、呼吸が苦しそうだっ
たりしたときは、すぐ受
診して。



⑪ アルコール 入りチョコ

ほとんど
危険なし

様子を見る

少量なら心配ありませ
ん。大量に食べた場合は
アルコール中毒を起こす
ことがあるので、様子
を見ておかしいと思ったら
病院へ。



⑮ ベビーパウダー

ほとんど
危険なし

様子を見る

少量なめた程度なら心
配ありません。ただ、粉
を大量に吸い込むと肺炎
やせきこみ、息が詰るな
どなどの症状が出るこ
とも。その場合は受診して。



④ 子どもの薬

ほとんど
危険なし

様子を見る

塗り薬をなめたくらい
なら問題ありません。か
ぜ薬のシロップを大量に
飲んだ場合は、吐かせて
受診しましょう。



⑧ 大人の薬

危険

水を飲ませ、吐か
せて至急病院へ

薬により危険度は異な
りますが、精神安定剤、
降圧剤、鎮痛剤などは危
険。かぜ薬も解熱作用の
あるアセトアミノフェン
で低体温や、いろいろな
臓器に障害を起こすこと
も。飲み込んだ薬を持参し病
院へ。



⑫ コイン

ほとんど
危険なし

吐かせる

のどに詰まっていたら
吐かせる。胃に落ちた
場合はほとんど排泄され
ますが、胃に落ちずに食
道にとどまっている場合
もあるので、受診して処
置を決めてもらいます。



⑯ 灯油・ガソリン

危険

何も飲ませず、
吐かせず、
至急病院へ

少量なめた程度なら様
子を見て。量を飲んでい
るときは、すぐ受診。吐
かせたものが気道に入
ると危険なので、家では吐
かせず、病院へ。

